

BUFFAGO

INTEROC @ CUSTER

REGISTRO: 142-I1-NA.

FORMULADOR: JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO.LTD.

DISTRIBUIDO POR: INTEROC S.A.

ACCIÓN FITOSANITARIA: Insecticida para el control de gusano blanco (*Premnotrypes vorax*), en el cultivo de papa (*Solanum tuberosum*) formulado en base a dos ingredientes activos.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Profenofos500 g/l
Fipronil 70 g/l

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Fipronil es un insecticida sistémico y de contacto que tiene efecto sobre el sistema nervioso central del insecto interfiriendo en la transmisión GABA (ácido gama amino butírico).

Mientras que Profenofos es un insecticida acaricida tanto de contacto como estomacal que inhibe la enzima acetilcolinesterasa interrumpiendo la transmisión de impulsos nerviosos.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable EC .

USO: Insecticida.

USO AGRÍCOLA DE BUFFAGO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	<i>Gusano blanco</i> (<i>Premnotrypes vorax</i>)	300 cc/200 l agua.

INTERVALO DE SEGURIDAD O ESPERA: No aplicar por lo menos 21 días antes de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas luego de la aplicación.

MODO DE EMPLEO: Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de **BUFFAGO** y agite. Adicione el resto de agua.

BUFFAGO debe ser aplicado en forma terrestre evitando su aplicación cuando se pronostique lluvia inmediata.

COMPATIBILIDAD: No mezclar el producto con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar mezclas.

PRECAUCIONES:

- Consérvese en lugar cerrado fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto lejos de alimentos y bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Posibles rutas de entrada: inhalación, ojos y piel. En contacto directo con piel y ojos puede causar moderada irritación en algunos individuos. La inhalación de la neblina de la aspersión puede causar irritación del tracto respiratorio en algunos individuos.
- No contamine lagos, ríos estanques o arroyos con residuos del producto ni con los envases vacíos.
- Este producto es altamente tóxico para aves y abejas y extremadamente tóxico para peces, evitar su aplicación en zonas cercanas a fuentes de agua y lugares donde habiten las aves.
- Aplicar durante las primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde para evitar que el viento arrastre la aspersión.

CATEGORÍATOXICOLÓGICA: II Moderadamente peligroso.

PRESENTACIONES:

Envase x 1 litro.
Envase x 300 cc.

AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del agricultor.